



# Asia

Workshop di Medicina Comportamentale del cane e del gatto

# Caso clinico

## Segnalamento

Cocker Spaniel

3anni

Femmina sterilizzata

11kg



## Problema lamentato

- Asia mostra aggressività verso persone sconosciute quando si trova sul divano (soprattutto se forzano il contatto)
- Asia ha aggredito in un paio di occasioni il cane convivente (Steve, Cocker spaniel 1aa MI)
- Asia è molto agitata (ultimamente soprattutto dal veterinario e in macchina)

## Quadro clinico

- Esame clinico veterinario e del sangue nella norma
- Asia ha sofferto di otite bilaterale (trattamento con lavaggi e gocce ad uso topico)
- Sterilizzazione (OHE) durante in periodo di estro, durante il primo calore
- Nessun problema di vomito e diarrea, dermatiti, scialorrea, etc.
- Asia non assume farmaci al momento della visita

## Provenienza e Sviluppo Comportamentale

- Asia è stata adottata verso i 70gg da un allevamento di Modena (zona isolata)
- Asia e Steve provengono dal medesimo allevamento, da cucciolate diverse...
- Steve (arrivato da meno di un anno) è un cane molto attivo, esuberante e ultimamente sta iniziando a mostrare atteggiamento simile a quello di Asia, nei confronti delle persone che entrano in casa...
- Asia ha presentato da cucciola problemi di otite bilaterale gestita con prodotti per il lavaggio otologico e gocce auricolari

## Anamnesi ambientale

- Asia vive con i proprietari e Steve in un appartamento al terzo piano di una palazzina nella periferia di Lucca. La zona attorno è tranquilla e piena di vegetazione.
- Asia e Steve rimangono spesso a casa da soli la mattina, quando i proprietari lavorano. Nel pomeriggio, di solito, la proprietaria torna a casa e li porta fuori per un'oretta

## Gestione

- **Cibo**: 2 volte al giorno (M/S) cibo commerciale light e ipoallergenico  
Asia non è vorace e ultimamente si porta il cibo nel salotto e lo mangia lì (le due ciotole sono posizionate in cucina, a volte Asia mangia in camera).
- **Uscite**: Asia tira molto al guinzaglio in passeggiata e Steve la segue.  
All'esterno Asia è molto meno vigile e più tranquilla.
- **Sistemazione in casa**: vivono in casa, una cuccia non usata è sistemata in camera. Asia è quasi sempre sul divano e ringhia o prova a mordere chi si avvicina...
- **Gioco**: Asia con diversi pupazzi, giochi che suonano e palline, lasciate sempre a disposizione. Steve spesso gioca al tiramolla con diversi giochi. I giochi sono sempre a disposizione e spesso Asia e Steve se li contendono.
- **Addestramento**: Asia ha seguito in passato un corso di educazione di base (seduto, terra, condotta) abbandonato per mancanza di tempo (dopo 3-4 mesi)

**video**

**foto**

## Descrizione dettagliata del problema

- Asia si mostra spesso spaventata nei confronti delle persone (soprattutto persone alte e persone vestite di scuro) che hanno un approccio troppo diretto nei suoi confronti.
- Asia ha bisogno di un po' di tempo per leggere il tipo di comportamento della persona che si trova davanti e, molto spesso, mostra tentativi di evitamento oppure tende a irrigidirsi se si trova in situazioni in cui percepisce difficoltà (trema, mostra midriasi e orripilazione del pelo sulla schiena).  
Se il tentativo di contatto prosegue, Asia prova a mordere (il tutto a volte preceduto da un breve ringhio...)
- Gli episodi in cui Asia ha tentato di mordere sono comparso negli ultimi tempi, nel periodo successivo alla rimozione dei punti di sutura della sterilizzazione e sempre e comunque in casa.
- Quando è molto nervosa, impedisce a persone estranee di sedersi sul divano, quando lei è sopra, abbaiando o provando a mordere.

## Comportamento aggressivo

- In passato Asia ha ringhiato a Steve e qualche volta l'ha morso sul muso (irritata dal suo continuo eccitamento e dall'insistenza nell'approccio)
- In seguito alla sterilizzazione Asia si è mostrata molto inibita e stressata (soprattutto nel portare il collare ad Elisabetta, durante la settimana successiva all'operazione), fino al momento della rimozione dei punti.  
I proprietari raccontano di continui lamenti, continua agitazione e graduale ipervigilanza: "Asia non stava ferma un attimo!"
- In seguito Asia ha mostrato un ulteriore, graduale aumento della reattività a diversi stimoli conosciuti e ulteriore innalzamento dello stato di vigilanza, diventando intollerante a tentativi di contatto o diffidente nei confronti di approcci troppo decisi.
- Si sono verificati episodi di aggressività in difesa di un oggetto (di solito un giocattolo) nei confronti di Steve, mordendolo alla gamba e sul muso (morso non tenuto, unico, veloce, preceduto da rapido ringhio).
- Ha provato a mordere la proprietaria in dinamiche simili (ringhio molto rapido, seguito subito da tentativo di morso).

**video**

**foto**

**Diagnosi?**

**Terapia?**

## Diagnosi

### Ansia intermittente

forte coinvolgimento del sistema noradrenergico e dopaminergico...

...(ipervigilanza, ipermotricità, forte evitamento, ptialismo, aggressività, etc.) ...

### Aggressività da irritazione

E' un tipo di aggressione abbastanza frequente (causata da diversi fattori, aumentata dal dolore e spesso legata alla frustrazione) si manifesta quando viene superata la soglia di tolleranza dell'animale (ad esempio al contatto) o quando non è capace di gestire lo stress del momento (incapacità a gestire i tempi di attesa).

### Deficit nella socializzazione interspecifica

...

## Diagnosi differenziale

- Aggressività territoriale
- "Rage Syndrome", distimia del Cocker Spaniel

...

## Terapia comportamentale:

### - Diversa gestione delle risorse presenti in casa

Impedendo che elementi come il divano o la cuccia possano diventare prerogative sociali importanti (e quindi da difendere). Il divano, per la posizione in cui era localizzato e per l'angolo che offriva alla porta di entrata/uscita, si è dimostrato risorsa di alto valore, dal punto di vista di Asia: ottimo come localizzazione, per osservare e controllare tutto quello che succede in casa (gente che sale al piano di sopra, gente che entra e/o esce, etc.).

### - Evitare di confrontarsi sulla gestione di una risorsa

(sia che sia un gioco, sia che sia un indumento, etc.).

Quando Asia difende la sua posizione sul divano non bisogna attaccarla frontalmente ma essere abili strateghi e provare prima a farla scendere attirandola in un'altra stanza o distraendola. Quando possibile discriminare attentamente quali sono gli oggetti, i luoghi o le occasioni in cui si mostrano episodi di aggressività con maggior frequenza. Se possibile sarebbe meglio inizialmente evitare le situazioni e diminuire le possibilità in cui il cane ha la possibilità di raggiungere la risorsa (qualunque essa sia) su cui mostra la maggiore reattività.

## Terapia comportamentale:

### - Evitare sempre punizioni e migliorare la comunicazione

mostrando chiaramente ad Asia quali sono i comportamenti da premiare e quelli non desiderati.

### - Educazione di base e lavoro sugli autocontrolli e i comportamenti di calma

Imposteremo inizialmente una corretta educazione di base (gestione corretta dei premi e delle punizioni, educazione agli insegnamenti di base, miglioramento degli autocontrolli). Esercizi come il seduto, il resta, il richiamo o altri, basati sul rinforzo dei comportamenti di calma, ci aiuteranno ad aumentare la concentrazione di Asia e il controllo che ha di se stessa, finalizzando il lavoro alla gestione nei momenti di forte eccitazione.

### - Organizzare una nuova cuccia per Asia

L'idea è quella di offrire una nuova cuccia e gradualmente sostitutiva del divano.

L'importanza di alcune parti della casa, intese come territorio di appartenenza di cane è relativo a diversi aspetti. La possibilità di controllare gli accessi e gli spazi di passaggio spesso rappresenta un valore elevato nella visione della posizione in cui il cane decide di stabilire la propria cuccia. Spesso il permettere di utilizzare o lasciare ambienti dell'abitazione vicini alla porta di entrata e uscita (ad esempio il corridoio di fronte, il divano del salotto di fronte all'entrata, etc.) rischia di essere letto dal cane come una concessione o ancor più come valida indicazione di quello che vogliamo: controlla!

## Terapia farmacologica

- Zylkene 225mg (1 capsula la mattina e 1 capsula la sera)
- DAP diffusore (nella zona della nuova cuccia)
- .....

## Follow up

### Seconda visita comportamentale al G30:

- Asia non ha mostrato comportamento di aggressione sul divano, da quando è stato spostato, seguendo il consiglio di evitare che fosse luogo “strategico” della casa
- I proprietari hanno iniziato a “ripassare” gli esercizi di seduto e terra con buoni risultati...
- La nuova cuccia è stata sistemata nelle vicinanze del divano, per essere gradualmente allontanata dal salotto...
- In generale Asia si mostra meno vigile e reattiva. Le passeggiate sono tranquille e creano pochi problemi (si è passati a pettorina e guinzaglio più lungo)